

AZOPLON CALC ICESORB należy stosować zapobiegawczo, nie później niż 12 h przed spodziewanymi przymrozkami. Zalecane stężenie roztworu nie powinno przekroczyć 1%.

Nawóz przeznaczony do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin oraz do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji. Więcej informacji na www.azoplone.pl.

DOKARMIANIE DOLISTNE

Orientacyjne dawki nawozu

Rośliny	Termin stosowania - faza rozwojowa	Dawka nawozu (l/ha)	Zalecana liczba zabiegów	Ilość cieczy użytkowej (l/ha)
Drzewa i krzewy owocowe	po wykształceniu zawiązków owocowych	4 – 8	4-8 razy w odstępach 2 tygodniowych	500 – 1000
Truskawki owocujące, Poziomki	w fazie wiązania i wyrastania owoców	3 – 4	2-3 razy w odstępach tygodniowych	500 – 800
Szalkówki ozdobne, owocowe i leśne	interwencyjnie	4 – 8	2-3 razy w odstępach 2 tygodniowych	500 – 1000
Warzywa polowe	od fazy 2. liścia	2 – 4	3-4 razy w odstępach 2 tygodniowych	500 - 1000
Uprawy szklarniowe	cały okres wzrostu roślin	2 – 6	w odstępach 2 tygodniowych	400 - 1200
Uprawy rolnicze	wczesne fazy rozwojowe	2 – 6	3 - 4 razy	150 - 1500



Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia).

Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

Przystępując do sporządzenia cieczy użytkowej należy:

1. Ustalić odpowiednią ilość wody i nawozu **AZOPLON CALC ICESORB**.
2. Do zbiornika opryskiwacza wlać ½ - ⅔ ustalonej ilości wody.
3. Produkt wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza (przy włączonym mieszadle).
4. Zbiornik uzupełnić wodą do założonej ilości.
5. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.
6. Po pracy zbiornik opryskiwacza dokładnie wymyć.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

W celu uzyskania szczegółowych zaleceń prosimy o kontakt z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. lub z agro@grupaaazoty.com.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów
tel: +48 32 738 20 00
e-mail: azoty.zach@grupaaazoty.com
chorzow.grupaaazoty.com | azotech.pl | fertiplon.pl

zamowienia.zach@grupaaazoty.com

+48 533 080 900 – Kierownik Działu Handlowego
+48 605 347 510 – Rynek Krajowy
+48 575 600 563 – Rynek Zagraniczny

GRUPA
AZOTY
CHORZÓW



azoPLON
CALC ICESORB



**Płynny nawóz azotowo-wapniowy zawierający sorbitol,
który ogranicza negatywny wpływ przymrozków**




azOPLON
CALC ICESORB

Skuteczna ochrona przed przymrozkami!

AZOPLON CALC ICESORB to płynny nawóz wapniowy zawierający azot i bor, przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin.

Nawóz został wzbogacony o sorbitol – związek chemiczny z grupy cukroli, który zapobiega powstawaniu kryształków lodu w komórkach roślin.



Magazynowanie osmotycznie czynnych substancji takich jak sorbitol wpływa na wzrost ciśnienia wewnątrzkomórkowego oraz obniżenie punktu zamarzania soków komórkowych, co z kolei przekłada się na zmniejszenie uszkodzeń mrozowych pąków kwiatowych, kwiatów oraz zawiązków owoców.

Wiosna to okres, w którym drzewa owocowe są najbardziej narażone na pęknięcia mrozowe i powstawanie zgorzeli. Szczególnie groźne są przymrozki, gdy temperatura wynosi od -1°C do nawet -10°C . Podczas takich minusowych temperatur tworzący się lód wewnątrz komórek może uszkadzać tkanki, które brązowieją i w konsekwencji zasychają.

Dolistny nawóz AZOPLON CALC ICESORB nie tylko wzmacnia odporność roślin na spadki temperatury, ale również zawiera azot i bor, które wspierają ich rozwój.


Dzięki innowacyjnej formule, pomaga ochronić owocowe plony przed stratami mrozowymi. W wielu przypadkach brak odpowiednich systemów zabezpieczających może prowadzić do dużych strat.

AZOPLON
CALC ICESORB



Składniki pokarmowe: % (m/m)

Azot całkowity (N)	8,5
Azot azotanowy (NO_3)	8,5
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie	17,0
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie	0,1



OPAKOWANIE



Kanister 5 l, 20 l



IBC 1000 l

SORBITOL

- ⦿ Zwiększa ruchliwość boru i jego przemieszczanie się w roślinie
- ⦿ Zapewnia szybkie pobieranie nawozu przez liście nawożonych roślin
- ⦿ Odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu rośliny w warunkach stresowych: przymrozki, susza, czy nadmierne zasolenie
- ⦿ Zapobiega powstawaniu kryształków lodu w komórkach roślin



Potencjalne korzyści



» chroni plony przed wiosennymi przymrozkami



» wspiera pobieranie innych składników odżywczych przez rośliny



» zmniejsza uszkodzenia mrozowe pąków kwiatowych, kwiatów oraz zawiązków owoców



» obniża punkt zamarzania soków komórkowych



» wpływa na lepszą jakość owoców, zwiększając ich trwałość



**GRUPA
AZOTY**
CHORZÓW