

azoPLON

GRUPA
AZOTY
CHORZÓW



azoPLON

UREA Super N 36

N (Mg) 27 (3) z mikroskładnikami



WARZYWA

2-3 l/ha



OWOCE

1-3 l/ha



ZBOŻA

4-5 l/ha



**ROŚLINY
OLEISTE**

5 l/ha

NAWOZY DO DOKARMIANIA DOLISTNEGO ORAZ FERTYGACJI

AZOPLON OPTI Super N to nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikami w postaci wodnego roztworu, przeznaczony do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin: upraw rolniczych i warzywniczych. Dostarcza roślinom azot w łatwo przyswajalnej formie amidowej zaraz po zastosowaniu dolistnym oraz mikroelementy w postaci schelatowanej. Stosowanie nawozu może mieć charakter profilaktyczny lub interwencyjny, w okresach stwierdzenia występowania objawów niedoboru mikroelementów.

SKŁADNIKI POKARMOWE

MAKROSKŁADNIKI

	(m/m)	% obj.
Azot N całkowity:	27	36,37
azot NO_3 azotanowy:	5	6,74
azot NH_4 amonowy:	3,2	4,31
azot NH_2 amidowy:	18,8	25,32
Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie:	3,0	4,04

MIKROSKŁADNIKI

	(m/m)	% obj.
Bor B, wodoru+	0,02	0,03
Miedź Cu rozpuszczalna w wodzie:	0,025	0,03
Miedź Cu schelatowana przez EDTA:	0,025	0,03
Żelazo Fe rozpuszczalne w wodzie:	0,01	0,01
Żelazo Fe schelatowane przez EDTA:	0,01	0,01
Mangan Mn rozpuszczalny w wodzie:	0,5	0,67
Mangan Mn schelatowany przez EDTA:	0,5	0,67
Molibden Mo rozpuszczalny w wodzie:	0,005	0,01
Cynk Zn rozpuszczalny w wodzie:	0,015	0,02
Cynk Zn schelatowany przez EDTA:	0,015	0,02

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA

Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji i odpowiednie odżywianie w krytycznych fazach wzrostu i rozwoju.

Szybkie uzupełnienie składników odżywczych.

Wysoki plon i zwiększenie parametrów jakościowych.

Wygodne stosowanie i całkowita rozpuszczalność w wodzie.

Wykazuje wysoką skuteczność działania w okresie stresu wodnego i tlenowego oraz podczas osłabionego przemieszczania się składników w roślinie.

Skutecznie likwiduje niedobory makro- i mikrośladników pokarmowych.

Możliwość aplikacji w szerokim zakresie upraw.

Obecność azotu w trzech formach azotanowej, amonowej oraz amidowej w korzystnych proporcjach.



INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz najlepiej stosować w dni pochmurne, przy dużej wilgotności powietrza, przy pełnym turgorze tkanek roślin. Wykonywanie zabiegu w najcieplejszych godzinach dnia znacząco obniża jego skuteczność, stanowi stres dla roślin i może powodować ich uszkodzenia (przypalenia). Zabieg dokarmiania dolistnego należy wykonać wieczorem lub rano, na suche rośliny, w porze bezwietrznej. Najlepiej zastosować zabieg drobnokroplisty w celu lepszego pokrycia powierzchni liści.

OPAKOWANIE, TRANSPORT, PRZECCHOWYWANIE

Kanister 5 l



IBC 1000 l na życzenie klienta

Kanister 20 l



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed każdym użyciem należy przeczytać informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegać środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

W celu uzyskania szczegółowych zaleceń prosimy o kontakt z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

tel: +48 32 736 20 00

e-mail: azoty.zach@grupaazoty.com

chorzow.grupaazoty.com | azoplom.pl

Masz pytania? Odpowiemy!

zamowienia.zach@grupaazoty.com

+48 575 600 561 – Manager ds. Rozwoju Rynku

+48 533 080 900 – Kierownik Działu Handlowego

+48 605 347 510 – Rynek Krajowy