



**azoPLON**  
**MICRO**

**Kukurydza**

**N (Mg, S) 8,5 (+8,2 +16,5)  
z mikrośkładnikami**



AZOPLON MICRO Kukurydza to specjalistyczny nawóz wielo-  
składnikowy z niezbędnymi dla prawidłowego wzrostu i rozwoju  
kukurydzy mikroelementami. Nawóz krystaliczny o niskiej  
zawartości chlorków, całkowicie rozpuszczalny w wodzie,  
przeznaczony do dolistnego dokarmiania kukurydzy. Stanowi  
idealne połączenie mikrośkładników z makrośkładnikami, takimi  
jak azot, magnez i siarka.

Nawóz szczególnie zalecany w momencie największego  
zapotrzebowania kukurydzy na mikrośkładniki lub w warunkach  
osłabienia roślin przez czynniki stresowe. AZOPLON MICRO  
Kukurydza stanowi cenne uzupełnienie nawożenia doglebowego  
wpływając korzystnie na wzrost i rozwój roślin oraz wielkość plonu  
i parametry jakościowe ziarna.

### ZALETY

- zastosowanie form chelatowych mikrośkładników (Cu, Mn, Zn, Fe) gwarantuje szybkie kompleksowe zaopatrzenie roślin w łatwo przyswajalne formy, zwłaszcza w momentach największego ich zapotrzebowania,
- zastosowanie nawozu w fazach intensywnego wzrostu i rozwoju kukurydzy wpływa na zwiększenie plonu ziarna poprzez lepszy rozwój kolb i ziarniaków,
- skutecznie likwiduje nagłe niedobory składników pokarmowych,
- kompleksowe zastosowanie najważniejszych dla kukurydzy mikrośkładników, w tym cynku i boru, gwarantuje jej prawidłowy wzrost i rozwój.

| Składniki pokarmowe                                 | %(m/m) | g/kg |
|-----------------------------------------------------|--------|------|
| Całkowity azot (N)                                  | 8,5    | 85   |
| azot amidowy                                        | 8,5    | 85   |
| Tlenek magnezu (MgO) rozp. w wodzie                 | 8,2    | 82   |
| Trójtlenek siarki (SO <sub>3</sub> ) rozp. w wodzie | 16,5   | 165  |
| Bor (B) rozp. w wodzie                              | 2      | 20   |
| Miedź (Cu) (EDTA) rozp. w wodzie                    | 0,550  | 5,5  |
| Mangan (Mn) (EDTA) rozp. w wodzie                   | 0,55   | 5,5  |
| Molibden (Mo) rozp. w wodzie                        | 0,015  | 0,15 |
| Cynk (Zn) (EDTA) rozp. w wodzie                     | 4,500  | 45   |

Zakres pH gwarantujący akceptowalną stabilność frakcji schelatowanej 4-7.

| Nazwa uprawy                     | Termin stosowania<br>- faza rozwojowa                     | Dawka nawozu<br>(kg/ha) | Zalecana liczba<br>oprysków | Zalecana ilość cieczy<br>użytkowej (l/ha) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Kukurydza                        | Faza 4 – 6 liści (BBCH 14 – 16)                           | 2 – 3                   | 1                           | 200 – 300                                 |
|                                  | Faza 7 – 8 liści (BBCH 17 – 18)                           | 2 – 3                   | 1                           | 200 – 300                                 |
|                                  | Rozwój źdźbła – do początku rozwoju wiechy (BBCH 31 – 51) | 2                       | 1                           | 200                                       |
| Groch<br>Bobik                   | Rozwój liści (BBCH 13 – 15)                               | 2 – 3                   | 1                           | 200 – 300                                 |
|                                  | Wydłużanie łodygi (BBCH 35 – 38)                          | 2                       | 1                           | 200                                       |
| Soja                             | Rozwój liści (BBCH 13 – 15)                               | 2 – 3                   | 1                           | 200 – 300                                 |
|                                  | Rozwój kwiatostanu (BBCH 52 – 55)                         | 2                       | 1                           | 200                                       |
| Łubin                            | Rozwój rozety (BBCH 23 – 29)                              | 2 – 3                   | 1                           | 200 – 300                                 |
|                                  | Rozwój kwiatostanu (BBCH 53 – 57)                         | 2                       | 1                           | 200                                       |
| Lucerna<br>Saradela<br>Koniczyna | Rozwój liści (BBCH 16 – 17)                               | 2 – 3                   | 1                           | 200 – 300                                 |

### OPAKOWANIE




Kartonik 4 kg



Worek 10 kg

### PRZECHOWYWANIE





# azopl<sup>on</sup>

## ZAMÓWIENIA I KONTAKT

[zamowienia.zach@grupaazoty.com](mailto:zamowienia.zach@grupaazoty.com)

Manager ds. Rozwoju Rynku: +48 575 600 561

Kierownik Działu Handlowego: +48 533 080 900

Rynek Krajowy: +48 605 347 510

**[www.azopl<sup>on</sup>.pl](http://www.azopl<sup>on</sup>.pl)**



Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.  
ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów  
tel: +48 32 736 20 00  
e-mail: [azoty.zach@grupaazoty.com](mailto:azoty.zach@grupaazoty.com)  
[chorzow.grupaazoty.com](http://chorzow.grupaazoty.com) | [azopl<sup>on</sup>.pl](http://azopl<sup>on</sup>.pl)

 [facebook.com/grupaazotychorzow](https://facebook.com/grupaazotychorzow)  
 [linkedin.com/company/azotychorzow](https://linkedin.com/company/azotychorzow)  
 [instagram.com/grupaazotychorzow](https://instagram.com/grupaazotychorzow)